

CURSO
actualización de
urgencias

PSICOSIS Y FÁRMACOS



M^aDolores Córdoba Marín.
Carlos Rehberger García.

**SERVICIO DE URGENCIAS
CAULE**



INDICE:

- **Psicosis.**
- **Tipos de psicosis.**
- **Diagnóstico diferencial.**
- **Tratamiento.**

PSICOSIS

**ADULTOS
JÓVENES**

Pérdida del contacto con la realidad.

PENSAMIENTO:

PERCEPCIONES:

- **Delirios**
- **Pensamiento desordenado y alteración del habla.**

- **Alucinaciones.**

TIPOS DE PSICOSIS:

< 6
meses.

Psicosis inducida por tóxicos.

Trastornos delirantes.

Psicosis orgánica.

Esquizofrenia.

> 6
meses.

Trastorno esquizofreniforme.

Trastorno bipolar.

Trastorno esquizoafectivo.

Depresión psicótica.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

**SD. CONFUSIONAL
AGUDO.**

INFECCIÓN DEL SNC.

EPILEPSIA.

**HISTORIA CLÍNICA
+
P. COMPLEMENTARIAS**

DEMENCIA.

**INTOXICACIONES
AGUDAS.**

**ALUCINACIONES
FISIOLÓGICAS HÍPNICAS**

CURSO
actualización
de urgencias


1ª
edición

PSICOSIS Y FÁRMACOS

5/12

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

**HISTORIA CLÍNICA
+
P. COMPLEMENTARIAS**



CURSO
actualización
de urgencias

1ª
edición

PSICOSIS Y FÁRMACOS

6/12

TRATAMIENTO

**ABORDAJE INICIAL Y
MEDIDAS DE SEGURIDAD**



**CONTENCIÓN VERBAL
MECÁNICA Y
FARMACOLÓGICA**

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

ANTIPSICÓTICOS ATÍPICOS

- Risperidona 1 mg VO
- Olanzapina 5-10mg bucodispersable oral; 10mg IM.
- Aripripazol.

1º Elección

+/-
Benzodiazepinas
VO/IM/ IV

PSICOSIS ORGÁNICA

Neurolepticos IM

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

**Haloperidol 5mg IM cada
30-40min hasta 15-20mg**

• Enf. Parkinson:

1º Elec. Quetiapina 25mg (0-0-1) de inicio VO.
2º elec. Olanzapina 10mg bucodispersable (5-
7,5mg en ancianos).

• Demencia:

Risperidona 0.5mg VO de inicio, hasta 4mg.
Haloperidol gotas (5-5-10) repetir cada 30
min 100-120gotas.

PSICOSIS Y FÁRMACOS

PSICOSIS PSIQUIÁTRICA

Neurolépticos IM +
Benzodiazepinas VO o IM

+/-25mg

Levomepromacina
o clorpromacina IM

Haloperidol 10mg IM +
Diazepam 10mg, pudiendo
repetir tras 45min.

No repetir a los 45min

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO

PSICOSIS SECUNDARIA
A TÓXICOS

TRATAMIENTO
FARMACOLÓGICO

• Intoxicación Etílica:

Tiaprizal 100mg IV, a pasar en 20 min,
pudiendo repetirse a los 20min.

• Cocaína:

Olanzapina 10mg VO+ Diazepam 10 mg IV.
NO HALOPERIDOL.

• Cannabis:

Haloperidol 10mg IM VO+ Diazepam 5 mg
IV o Lorazepam 1mg VO,SL.

• Sd. Abstinencia:

Diazepam 20mg IM repitiendo cada 30
min.

- Nunca pautar Olanzapina IM tras tratamiento con Benzodiazepinas IM o IV, **RIESGO DE DEPRESIÓN RESPIRATORIA.**
- La Risperidona y Quetiapina producen **↓TA.**
- Cuidado, **Haloperidol IV** en bolo, tiene riesgo de **arritmia maligna.** En caso de pautarlo, infusión en 30 min.

CURSO
actualización
de urgencias

1ª
edición

PSICOSIS Y FÁRMACOS

12/12

Valorar la capacidad de decisión de un paciente.

**FUGA/ ALTA
VOLUNTARIA.**



CURSO
actualización
de urgencias

1ª
edición

¡GRACIAS!